

Comparaison entre Temnothorax nigriceps (Mayr) et T. Tuberosus (Fabricius)
 (Tuberosus Fabricius = pyrenaeus Bondroit = melanocephalus Emery(?))
 (document de Travail 1976, repris 2008)

nigriceps

tuberosus

ouvrière

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - fémurs bruns ou brunâtres aussi foncés que la bande sombre du gastre (rarement un peu plus clairs). - épines épinothorales de longueur supérieure ou égale à la longueur des soies du pétiole - Profil du dos plat, voire un peu concave sur le mésonotum et le début de l'épinothorax. Profils du pronotum et de l'arrière de l'épinothorax inclinés vers le bas et formant souvent un angle avec la zone moyenne plane. - Milieu du dos du thorax souvent dépourvu de rides sur une assez large surface lisse ou faiblement ponctuelle et relativement luisante. (dos rarement peu ou non luisant). - L'arrière du noeud pétioleux forme avec le cot postérieur du pétiole un angle largement obtus ou une sinuosité large, sans angle. - Bande sombre du gastre occupant des 2/3 postérieurs à la totalité du 1^{er} tergite. - Thorax d'un jaune souvent rougeâtre. | <ul style="list-style-type: none"> - fémurs plus clairs que la bande sombre du gastre, souvent jaunes, jamais brun sombres. - épines épinothorales de longueur inférieure ou égale à la longueur des soies du pétiole - Profil du dos faiblement et assez régulièrement convexe d'avant en arrière, sans aspect anguleux au pronotum ou à l'épinothorax. (assez bon caractère, bien que pas toujours absolu) - Milieu du dos du thorax à rides longitudinales ou réticulées, parfois atténuées au milieu, mais de manière marquée par une ponctuation serrée. (rarement luisant sur un point étroit). - L'arrière du noeud pétioleux tombe sur le cot postérieur du pétiole en angle à peu près droit (ou peu aigu ou obtus). - Bande sombre du gastre occupant de 1/6 à 7/8 postérieurs du 1^{er} tergite (le plus souvent $\leq 2/3$). - Thorax d'un jaune plutôt testacé. |
|---|--|

reine

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - fémurs brun plus ou moins foncés, comme le gastre. - Scutellum lisse sur une surface médiane égale et plus souvent supérieure au 1/3. - Noeud pétioleux peu anguleux, avec en arrière une sinuosité non anguleuse ou un angle très obtus (cf ouvrière). - Gastre entièrement brun foncé. - Taille générale parfois plus grande. | <ul style="list-style-type: none"> - fémurs jaunes ou tout au plus bruns pâles. - Scutellum très strié, à surface lisse nulle ou réduite au 1/3 médian. - Noeud pétioleux assez anguleux le plus souvent, avec un angle droit en arrière comme chez l'ouvrière. - Base du gastre parfois un peu jaune. - Taille générale parfois plus petite. |
|---|--|